

Gastroskopi hakkında hasta bilgilendirme

Gastroskopi yada midenin aynayla incelenmesi; ince, esneyebilen bir aletle yemek borusu, mide veya onikiparmak bağırsağının iç kısmının direk incelenmesi demektir. Yemek borusu, mide veya onikiparmak bağırsağının pek çok hastalıklarının bu inceleme yöntemi ile direk görerek teşhis edilmesi ve gerekli durumlarda doku örneklerinin ağrısız bir şekilde alınması mümkün olmaktadır.

Sınırlı bazı hastalık tedavi imkanı da bu inceleme yöntemi ile kombine olarak uygulanabilmektedir. Buna ilaveten kanamalı ya da kanama riskli kan damarlarının tedavisi, yabancı cismin dışarı çıkartılması, yemek borusundaki olası daralma yer ve bölgelerinin bu alet sayesinde genişletilmesi gibi şeyler sayılabilir.

Ön hazırlık

Mideniz boş olmalıdır. İnceleme öncesindeki gece yarısından itibaren herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Sabahleyin doktorunuzun yazdığı ilacı almalısınız, bu ilacı mümkün olduğunca az miktarda su ile alınız. Eğer İnsülin almanız gerekli ise bunu en fazla her zamanki miktarın yarısı olacak şekilde azaltarak alınız. İnceleme öncesinde Anti-asit (Alucol, Anacidal, Gaviscon) v. b. ilaç almayınız. İnceleme öncesi sigara içmeyiniz.

Bildirim

İncelemin yapılacağı gün ve saat size doktorunuz kanalıyla yada direk yazılı olarak bildirilecektir. Size bildirilmiş gün ve saatte Zug Kanton Hastanesinin hasta müracaat kısmına geldiğinizi bildirin. Lütfen hastaneye kendi özel aracınızı kullanarak gelmeyiniz. Aşağıda söz konusu edilecek, inceleme için hazır hale getirilmeniz sırasında verilecek olan uyku verici ilaç nedeniyle 24 saat süreyle araç kullanmanız yasaktır.

Sizi kim inceleyecek?

Zug un Kanton Hastanesinde Bay Dr. Diem tarafından ve Endoskopi asistanlarının eşliğinde incelemeye alınacaksınız.

İncelemenin akışı

Doktor ve Endoskopi yardımcısı tarafından bir kez daha; planlanmış inceleme hakkında bilgi sahibi edilecek ve söz konusu olabilecek sorularınıza cevap bulacaksınız. Lütfen en geç bu sırada varsa mevcut hastalığınızı, daha önceki endoskopik incelenmenizi, allerjik reaksiyonlarınızı ya da ilaçların yan etkilerine karşı hassasiyetinizi söz konusu ediniz ve söyleyiniz. Protez diş taşıyorsanız, bunu şimdi çıkarmalısınız. Acı bir spreyle boğazınız bölgesel olarak hissizleştirilecek, kısa süre etkili uyku verici bir enjeksiyonla inceleme sırasındaki gerginliğiniz giderilecektir. Siz sol tarafınıza uzanmış halde iken, elastik olan bu alet ağzınızdan onikiparmak bağırsağınıza kadar sokulacaktır. Bu inceleme sırasında normal olarak solunumunuzda değişiklik olmaz ve ağrı duymazsınız. Solunumunuz ve kan dolaşımınız sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır. İnceleme ekibi sözkonusu sakinleştirici ilaç ile incelemenin mümkün olabildiğince basit, dikkatli ve özenli geçmesi için elinden gelen çabayı gösterecektir. İnceleme aşağı yukarı 15 dakika sürmektedir. Bu süre beklenmedik durumlarda uzayabilir. Sonuç olarak sakinleştirici ilacın etkisi, şayet gerekirse bir başka ilaç ile kısmi olarak ortadan kaldırılacaktır. Olağandışı durumlar hakkında size derhal bilgi verilecektir.

İnceleme sonrası

Normal olarak incelemeden sonra hasta ayağa kalkıp kafeteryada gücünü yeniden toplayabileceği birşeyler aldıktan sonra eve gidebilir. Lütfen dikkat ediniz, incelemeye hazırlık için verilmiş bulunan ilaçlardan dolayı, daha sonraki 24 saat içerisinde araç kullanmayınız. Tam dikkat gerektiren önemli kararlar almanız gereken yerlerde bulunmayınız. En iyisi bir akraba ya da tanıdığınız eşliğinde eve gitmenizdir. İstisnai olarak inceleme sonrasında burada birkaç saat uyumanız ya da kontrol altında tutulmanız gerekebilir. Ama bu kural değil istisnadır.

Hastanın sakinleştirici ilaç etkisiyle, inceleme esnasında olanları hatırlayamaması da nadiren görülebilir.

İncelemenin riskleri

Hiçbir doktor size rizikosuz bir incelemeyi garanti edemez. Midenin ayna ile incelenmesinin riski çok azdır ve komplikasyon olasılığı binde birdir. Çoğu kez mevcut bir hastalıktan kaynaklanır.

Komplikasyon olasılıkları: Kanama oluşması, sindirim yolu duvarının yaralanması ya da delinmesi (Perforasyon), sakinleştirici olarak verilen ilacın yan etkisi olarak aşırı hassaslaşma reaksiyonunun ortaya çıkması ya da solunum yavaşlaması.

Tedavi amaçlı bir müdahalede komplikasyon olasılığı artar, ama bu durum önceden sizinle konuşulacaktır. En kötü komplikasyon olasılığı cerrahi bir müdahaleyi ya da kan verilmesini gündeme getirebilir. Komplikasyon tehlikesi, yukarıda söz konusu olan kurallara tam olarak uymanız halinde en aza inecektir.

Sorular

İnceleme ve riskleri hakkındaki sorularınız için bizi telefonla arayabileceğiniz gibi randevu da talep edebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı isterseniz inceleme öncesinde, incelemeyi yapacak ekibe sorabilirsiniz. Ağrı, kan kaybı ve diğer komplikasyonlar söz konusu olacak olursa tereddüt etmeden derhal ve her an telefon edebilirsiniz.

Aşağıda attığım imza ile bütün okuduklarımı anladığımı ve hekimin açıklaması sonucu teşhis, bu tür incelemenin, ayrıca incelemenin gidişi ve riskleri hakkında yeterince bilgilendirildiğimi kabul ediyorum. Tüm sorularım memnuniyetle yanıtlandırılmıştır. Bu yöntemi kabulleniyorum.

Yer / Tarih _____ Hasta imzasi _____ Hekim imzasi _____